



الفرق في بعض الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان والعاديين

إعداد

أ/ خالد محمد السيد علي مجاهد

المدرس المساعد بقسم الصحة النفسية كلية التربية - جامعة الأزهر

أ.د/ محمود محي الدين سعيد عشري

أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية الأسبق كلية التربية - جامعة الأزهر

د/ محمد محمد العربي إبراهيم

أستاذ التربية الفنية المساعد كلية التربية - جامعة الأزهر

د/ أحمد عبد التواب كامل

مدرس الصحة النفسية كلية التربية - جامعة الأزهر بالقاهرة

الفروق في بعض الأضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان والعاديين
خالد محمد السيد علي مجاهد ، محمود محي الدين سعيد عشري ، محمد محمد
العربي إبراهيم، أحمد عبد التواب كامل

قسم الصحة النفسية، كلية التربية بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، مصر

البريد الإلكتروني: khattat00@gmail.com

الملخص:

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن الفروق في بعض الأضطرابات النفسية (اضطراب التواصل - تقدير الذات المنخفض-الأعراض الاكتئابية - قلق الموت) بين أطفال مرضى السرطان والأطفال العاديين، وتكونت العينة من (80) طفلاً بواقع (50) من أطفال مرضى السرطان بمستشفى دار السلام للأورام بالقاهرة، و(30) طفلاً من الأطفال العاديين بمدرسة المنشي الجديدة للتعليم الأساسي وترواحت أعمارهم من (9:12) بمتوسط عمري (11,05) وانحراف معياري (0,981). وتم استخدام مقاييس اضطراب التواصل ومقاييس تقدير الذات المنخفض ومقاييس الأعراض الاكتئابية ومقاييس قلق الموت، وهم من إعداد الباحثين، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (01) بين متواسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقاييس اضطراب التواصل الاجتماعي، وعند مستوى (05)، على مقاييس تقدير الذات المنخفض ومقاييس الأعراض الاكتئابية. وكانت الفروق في اتجاه مرضى السرطان، كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين على مقاييس قلق الموت، كما اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أطفال مرضى السرطان الذكور والإباث على مقاييس الأضطرابات النفسية .

الكلمات المفتاحية: الأضطرابات النفسية، اضطراب التواصل الاجتماعي، تقدير الذات المنخفض-الأعراض الاكتئابية، قلق الموت، أطفال مرضى السرطان.



Differences in some mental disorders For children with cancer and normal patients

**Khaled Mohamed Elsaied Megahed, Mahmoud Mohie Eldein
Saeed Ashry, Mohamed Mohamed Elaraby Ebraheem, Ahmed
Abd Eltawab Kamel.**

**Egypt AL-Azhar University Faculty of Education (for males) In
Cairo, Department Of Psychological health .**

ABSTRACT:

The current research aimed to determine the differences in some psychological disorders (communication disorder , low-self esteem , Depressing symptoms, (concern of death) among the children of cancer patients and normal children, the sample of research was(80) children(50) of them were children cancer patients, and 30 of them were non cancer patients at the Dar Elsalam hospital for cancer in Cairo, their ages were from (9:12) their average age is “11.05” and a standard deviation 0.981 the standards of the communication disorder, low-self esteem , the standard of the depressing symptoms and the standard of concern of death were used and prepared by the researchers. The results showed that there are statistical differences'0.01" between the medium grades of the children of cancer patients and the normal , on the standard of the communication disorder , on the standard of the depressed symptoms for the children of cancer patients , on the standard of the low-self esteem for the children of cancer patients . The results showed that there were statistical differences between the medium grades of the children of cancer patients and the normal. , on the standard of concern of death for the children of cancer patients. . The results of the research assured that there are no statistical differences between the medium grades of the children of cancer patients the males and females on the standard of the psychological disorders.

Keywords: Psychological disorders, social communication disorders, the low-self esteem, Depressing symptoms, death anxiety, Patient children of cancer.

المقدمة:

يعد مرض السرطان من الأمراض التي يصاحبها العديد من الاضطرابات النفسية وبخاصة بالنسبة للطفل؛ حيث لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي نظراً ل تعرضه للكثير من الأدوية الكيماوية التي تؤثر على سلوكه وحالته النفسية.

وفي ضوء ما يتعرض له أطفال مرضى السرطان من علاج كيميائي وإشعاعي على الجمجمة والجهاز العصبي المركزي، والذي يؤثر تباعاً على معظم العمليات والوظائف العقلية المعرفية (Aldridge, Roesch, 2006:116)، مما يؤدي إلى معاناة هؤلاء الأطفال من بعض الاختصاصات النفسية مثل قلة الهمة والإكتئاب.

ويتعرض أطفال مرضى السرطان إلى تدهور في النمو الجسسي حيث يعاني من انخفاض في وزنه وفقدان شعر الرأس، واحمرار وطفح جلدي، وتقرح في الفم والحلق، وفقدان القدرة على تذوق الأطعمة وتدمير جزء كبير من الخلايا العصبية والفاقد منها لا يعود، National Cancer Institute, 2001: 34- (39).

ويُعتبر مرض السرطان من الأمراض المُزمنة المُهددة للحياة حيث يُسبب العلاج الشعور بالألم والقلق والضعف، فهـى أمور مُرتبطة بالإجراءات الطبية مثل سحب النخاع العظمي، والعلاج بالأشعة، والعلاج الكيماوى الذى تختلف أثاره الجانبية بحسب نوع الدواء المستخدم وكمية وقوـة الجرعـات الـتى يتلقـاها المـريض فـمن آثارـه الجانبـية قـدـدانـ الشـعـرـ والغـيـانـ والنـقـيـوـ، وهـى من الأمـور الـتى تـؤـثـرـ فيـ الجـانـبـ النـفـسـىـ لـلـمـريـضـ بشـكـلـ كـبـيرـ وـمـنـ ثـمـ تـظـهـرـ العـدـيدـ مـنـ الـاضـطـرـابـاتـ النـفـسـيـةـ لـدىـ مـريـضـ السـرـطـانـ مـثـلـ قـلـقـ الموـتـ وـالـأـعـراـضـ الـاـكـتـيـانـيـةـ .(Cancer Council, NSW, 2012)

وَتُعَدُّ الاِضْطِرَابَاتُ النُّفْسِيَّةُ مِنْ أَكْثَرِ الْمُشَكَّلَاتِ اِنْتَشَارًا لِدِي أَطْفَالِ مَرْضِيِّ السُّرْطَانِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ دَرَاسَةً بَارْكَلِي (Poder, 2008) أَنَّ أَبْعَاءَ الْمَرْضِ عِنْدَ أَطْفَالِ مَرْضِيِّ السُّرْطَانِ كَانَتْ لِفَقْدَانِ الشِّعْرِ وَ(2%) لِصَعْوَدَةِ الْبَلْعِ وَفُقدَانِ الطَّاقَةِ، (5%) كَانَتْ عَلَى شَعُورِ الْطَّفَلِ بِالْتَّوْتُرِ وَالْأَلَمِ وَالصَّعْوَدَةِ فِي التَّنَفِّسِ وَاضْطِرَابَاتِ التَّوَاصِلِ الاجْتِمَاعِيِّ، كُلُّ هَذِهِ الْأَمْوَرِ تَفْرُضُ عَلَى الْطَّفَلِ حَالَةً مِنَ الْفَلْقِ وَالْإِنْزِعَاجِ الْمُسْتَمِرِ وَالشَّعُورِ بِاِخْتِلَافِهِ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَطْفَالِ، مَا يَجْعَلُهُ يُفْضِّلُ الْعَزْلَةَ عَنِ الْاِخْتِلاطِ بِمَنْ هُمْ فِي سَنَهِ مَا يَسْتَوْجِبُ وَجْدَ بِرَامِجِ إِرشَادِيَّةٍ ضَرُورَةً مُلْحَةً لِمِيزَانِ الْفَقَةِ مِنَ الْأَطْفَالِ.

مشكلة البحث

نبع مشكلة البحث الحالي من خلال ملاحظة الباحثين انتشار العديد من الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان (اضطراب التواصل الاجتماعي - تقدير الذات المنخفض - الأعراض الاكتئانية - قلق الموت). وأن لهذه الاضطرابات انعكاسات عديدة واضحة وأزمات نفسية على الطفل تجعله في حالة قلق وعزلة وضعف في تقديره لذاته مقارنة بالأطفال العاديين مع وجود فروق في هذه الاضطرابات في إتجاه أطفال مرضى السرطان، وهذا ما أكدته دراسة باركلي (2008)، ودراسة (Poder, 2006:116) (Aldridge, Roesch, 2008:116). ودراسة & nskar دراسة (Essen/2008)، ودراسة الخطيب وعوض الصالحي (2003)، وعلى المستوى الفردي فإن الطفل



يشعر بحالة من القصور والضعف عند أدائه للمهام المطلوبة منه، وتبلورت أيضاً مشكلة البحث من خلال زيارة ميدانية لمستشفى أطفال مرضى السرطان والتي لاحظ فيها الباحثون معاناة أطفال مرضى السرطان من هذه الاضطرابات النفسية السابقة ذكرها، والمشكلات التي يتعرضون لها من تغير في نمط حياتهم مثل التردد بشكل دائم على المستشفى أو الإقامة المستمرة مما يجعلهم يشعرون بالخوف والقلق والتوتر والاعتماد على الآخرين، وبناء على ما سبق تتضح الحاجة إلى التعرف على الفروق في تلك الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان والعاديين، وتتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- ما الفروق في اضطراب التواصل بين أطفال مرضى السرطان والعاديين ؟
- ما الفروق في تقدير الذات المنخفض بين أطفال مرضى السرطان والعاديين ؟
- ما الفروق في الأعراض الاكتئابية بين أطفال مرضى السرطان والعاديين ؟
- ما الفروق في قلق الموت بين أطفال مرضى السرطان والعاديين؟
- ما الفروق في الاضطرابات التالية (اضطراب التواصل - تقدير الذات المنخفض- الأعراض الاكتئابية- قلق الموت) لدى أطفال مرضى السرطان وفقاً لمتغير النوع (ذكور- إناث)؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

- الكشف عن الفروق في بعض الاضطرابات النفسية بين أطفال مرضى السرطان والعاديين.
- التعرف على الفروق في بعض الاضطرابات النفسية تبعاً لمتغير النوع (ذكور- إناث) لدى أطفال مرضى السرطان.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في الآتي:

- من الناحية النظرية: تتضح من خلال تسلیط الضوء على اضطراب التواصل وتقدير الذات المنخفض والأعراض الاكتئابية وقلق الموت لدى أطفال مرضى السرطان، وإثراء المكتبة العربية بتلك المتغيرات وتأثيرها على هؤلاء الأطفال.
- من الناحية التطبيقية: تتضح من خلال معرفة الفروق التي قد تتوضح بين الجنسين، وهذا يفيد في عملية التشخيص السليم ومن ثم وضع العلاج المناسب من قبل المختصين .

مصطلحات البحث:

-1- الاضطرابات النفسية:

تعرف الاضطرابات النفسية بالدراسة الحالية بأنها وجود خلل في بعض الجوانب النفسية للطفل نتيجة لتأثيره بعض العوامل مثل عدم فهم جوانب الشخصية، وفقدان معنى الحياة،

والشعور بالضعف واليأس، مما ينتج عنه ضعف في التوافق النفسي والاجتماعي لدى الطفل
وهي على النحو التالي :

2- اضطراب التواصل الاجتماعي : شعور الفرد بضعف الرغبة في المشاركة مع الآخرين، وتجنب التواصل معهم والعزوف عن التواجد في المناسبات، مع عدم الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية، واحساسه بتجنب ونبذ الآخرين له.

3- تقدير الذات المنخفض : نظرة الفرد السلبية لذاته وقدراته، والتي تظهر في عجزه عن القيام بواجباته، وتحقيق أهدافه وطموحاته، والنظرية السلبية للحياة، مع صعوبة القدرة على المواجهة والتحدي، ووجود قصور في فهم جوانب القوة والضعف في شخصيته.

4- الأعراض الاكتئابية : وهي مجموعة من المظاهر السلوكية تؤثر على شعور الفرد، وتتمثل في قلة الانتباه، وتذكر الأحداث الصادمة مع الشعور بالعصبية والتوتر، وفقدان معنى الحياة ، مع وجود اضطرابات في النوم ومشكلات في الوزن وفقدان الشهية .

5- قلق الموت : هو شعور الفرد بالفزع أو الخوف أو الرعب عند التفكير في الموت أو تذكر مواقف مخيفة والشعور بالتشاؤم عند تذكر الحوادث والأزمات، وما يتربى على الموت من آثار نفسية سلبية كالفرقاب والبعد عن الآخرين .

6- أطفال مرضى السرطان : هم الأطفال الذين تم تشخيصهم بسرطان الدم ويقيمون بمستشفى سرطان الأطفال، ويتراوح أعمارهم من (9-12) عاماً.

حدود البحث :

الحدود البشرية : تم إجراء البحث على مجموعة من أطفال مرضى السرطان ممن تتراوح أعمارهم من

(12-9) عاماً . والأطفال العاديين من مدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي.

- الحدود المكانية : تم تطبيق البحث بمستشفى دار السلام للأورام بالقاهرة، مدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي.

- الحدود الزمنية : تم تطبيق أدوات البحث خلال شهر ديسمبر 2021م وشهر يناير 2021م.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولاً: اضطراب التواصل الاجتماعي: (Social Communication Disorder)

ويعرف بأنه صعوبة أساسية في الوظيفة العملية أو الاستخدام الاجتماعي للغة والتواصل، ويفتر من خلال قصور في فهم واتباع القواعد الاجتماعية للتواصل اللفظي وغير اللفظي المحكية في السياقات الطبيعية، وصعوبة في تغيير اللغة وفقاً لاحتياجات المستمع، وفي اتباع قواعد المحادثة وسرد القصص، وينتج عنه قصور وظيفي في قدرات التواصل، والمشاركة الاجتماعية وتنمية العلاقات الاجتماعية الدراسية أو الأداء المهني، ويصنف هذا اضطراب ضمن الدليل التشخيصي الخامس (DSM - 5) فئة اضطراب التواصل الاجتماعي



لتشخيص الأفراد الذين يعانون من مشاكل التواصل اللفظي وغير اللفظي (2016, 287-295). (Taylor & Whitehouse).

وعرف (Mattila, 2013) اضطراب التواصل بأنه يشير إلى: الأفراد الذين يظهرون قصوراً في التواصل والتفاعل الاجتماعي دون أن يظهروا أية أنماط متكررة من السلوكات المحدودة وقلة الاهتمامات والأنشطة.

وأشار (Norbury, 2013) إلى أن اضطراب التواصل: إعاقة وقصور في جميع جوانب التواصل المحددة والتي تشمل استخدام التواصل في التبادل والتفاعل الاجتماعي، ونمط التواصل المناسب للسياق، واتباع قواعد المحادثة والسرد والفهم الضمني، أو فهم اللغة الغامضة.

وعرف (McDonald, Togher, & Code, 2014) اضطراب التواصل الاجتماعي بأنه قصور في مهارات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن قصوراً في متطلبات التواصل، واستماع وفهم الآخرين وفهم وممارسة التواصل، وتنظيم الانفعالات أثناء التفاعلات الاجتماعية، ومراعاة القواعد الاجتماعية.

المحاكات التشخيصية لاضطراب التواصل:

وقد حدد الدليل التشخيصي والإحصائي للأضطرابات النفسية الطبعة الخامسة (DSM-5, 2013) المعايير التشخيصية لاضطراب التواصل الاجتماعي وهي كالتالي :

- صعوبات مستمرة ودائمة في الاستخدام الاجتماعي للتواصل اللفظي وغير اللفظي .
- قصور في استخدام التواصل في الأغراض الاجتماعية مثل تبادل التحية والمعلومات على نحو مناسب للسياق الاجتماعي .
- انخفاض القدرة على تغيير طرق التواصل لتتناسب مع السياق أو مع احتياجات المستمع مثل التحدث بشكل مختلف في الفصل المدرسي مقارنة بالتحدث في ملعب المدرسة والتحدث مع الطفل بشكل مختلف عن التحدث مع الكبار وتتجنب استخدام لغة رسمية أثناء التحدث بشكل عام.
- صعوبات في اتباع ومراعاة القواعد أثناء المحادثة وسرد القصص مثل انتظار الدور أثناء المحادثة ومعرفة كيفية استخدام الإشارات اللفظية وغير اللفظية لتنظيم التفاعل .
- صعوبات في فهم واستنتاج ما لم يتم ذكره بشكل صريح أثناء المحادثة (مثل الاستدلالات والاستنتاجات) وعدم فهم المعاني الحرافية أو الغامضة للغة (مثل عدم فهم المصطلحات والتعابيرات والتكاثر والاستعارات المجازية والمعاني المتعددة التي تعتمد على السياق لتفسيرها وفهمها).
- لا ترجع الأعراض السابقة إلى حالة طبية أو عصبية أخرى أو إلى القدرات المنخفضة في مجالات بنية الكلمة أو القواعد ولا تعزى كذلك إلى اضطراب طيف التوحد والإعاقة الفكرية وتأخر النمو أو اضطراب عقلي آخر.

ثانياً : تقدير الذات المخفض:

يعد تقدير الذات من مكونات شخصية الفرد، ويوصف تقدير الذات بأنه بناء متعدد الأبعاد مثل (البعد الأكاديمي والبعد العائلي والبعد الشخصي) وبعد تقدير الذات بناء نفسى متعدد الأبعاد وال المجالات، وقد يختلف تقدير الفرد لذاته باختلاف هذه الأبعاد وال المجالات .(Chen,2011).

ويتواجد لدى الأفراد بدرجات مختلفة ومتفاوقة مما يعكس إحساس الفرد بقيمة وفاءه وبذلك فهو يختلف من فرد إلى آخررأي أن هذا المفهوم عبارة عن خليط مركب من التقييمات والاتجاهات الذاتية للفرد تجاه نفسه .(Kavas, 2009)

وقدعرف كل من (Marcic & Grum, 2011, 373:374) مفهوم الذات بأنه مجموعة منظمة من الخصائص والميزات والمشاعر والصور والمواصفات والقدرات وعناصر نفسية أخرى. بينما يشير تقدير الذات إلى معتقدات الفرد حول ما يستحقه وهو يعني رضا الفرد عن نفسه فيشعر أنه مستحق للتقدير والاحترام.

ويعتبر تقدير الذات من أكثر المصطلحات استخداماً وانتشاراً في دراسة الذات (leary, 2004)، ويعني نجاح الفرد في أن يصبح على الصورة التي يرجوها لنفسه ، وأن يمارس العمل الذي يحبه ، ويتحقق له حاجاته الأخرى. واعتبره إبراهام ماسلو أرقى الحاجات الإنسانية عندما صاغ نظريته في الدوافع وشيد هرمته الشهير الذي بدأ قاعدته بالدوافع البيولوجية ثم الحاجة للأمن فالحب والانتماء ثم تقدير الذات، وانتهى بالدافع الأسمى، تحقيق الذات self actualization.

ويعرف (Orth&Robins, 2010) تقدير الذات بأنه: حكم ذاتي على جدارة الشخص، يعبر عنه باتجاهاته نحو نفسه. أما روزنبرغ (Rosenborg) فيعرف تقدير الذات بأنه: الشعور بالقيمة، حيث يرى أن تقدير الذات مفهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه، إما أن يكون إيجابياً أو سلبياً، يتمثل بشعور الفرد بأنه ذو قيمة، ويحترم ذاته لما هي عليه.

كما يعرف تقدير الذات بأنه التقييم الشامل الذي يعطيه الفرد لنفسه، والذي يعكس نظرته لإنجازاته وقدراته وقيمه وممتلكاته وكيفية استجابة الأفراد الآخرين له (Kavas, 2009).).

ويعرف (Guindon,2002:207) تقدير الذات بأنه الحكم الموضوعي الفعال على مفهوم الفرد عن ذاته ، ويكون من مشاعر التقدير والتقبل التي تنمو نتيجة استخدام الكفاية والشعور بالإنجاز والضبط الداخلي.

مصادر تقدير الذات :

ينذكر (79: 75, Mruk, 2006) أن هناك أربعة مصادر لتقدير الذات: (القوة Power) ويقصد بها القدرة على التأثير والسيطرة على الآخرين، وهو تعبير يستخدم لوصف قدرة الفرد على إدارة بيئته، وتقدير الأهمية للذات من قبل الآخرين وأن يكون ذى أهمية وفعالية بالنسبة لهم، فعندما يكون الفرد مهملًا قليل القيمة، متزوكاً كل هذا يؤثر سلباً على تقدير الذات،



ووصفه أيضاً بالتمسك بالمعايير الأخلاقية، والأداء الناجح فيما يتعلق بالهدف في هناك علاقة بين تقدير الذات والنجاح.

وقد قسم عويد المشعان وأمثاله (2013) مجالات نوعية الحياة إلى أربعة مجالات على النحو الآتي:

أولاً: **مجال الصحة الجسمية**: ويشتمل على إدراك الفرد لنوعية حياته من ناحية جوانب محددة، أهمها: النشاط أو الطاقة، والتعب، والألم، وعدم الراحة، والنوم.

ثانياً: **مجال الصحة النفسية**: ويتضمن هذا المجال تقدير الفرد لنوعية حياته في عدد من الجوانب، أهمها: المظهر وصورة الجسم، وتقدير الذات والتفكير والتعلم والذاكرة والتركيز والانتباه.

ثالثاً: **المجال الاجتماعي**: ويشمل العلاقات الشخصية، والدعم الاجتماعي الذي يتلقاه الفرد.
رابعاً: **المجال البيئي**: ويشمل الحرية والأمان الشخصي والجسيمي، والرعاية الصحية، وبيئة المنزل، ونشاط وقت الفراغ، والتلوث والفضاء والطقس ووسائل المواصلات.

مكونات تقدير الذات :

يرى عبد الكريم جرادات (2006) أن تقدير الذات يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:

- الشعور بالانتماء: ويعني أن ينتهي الفرد إلى جماعة، ويكون مقبولاً فيها ولديه انسجام وتوافق متبادل مع أفراد هذه الجماعة.

- الشعور بالكفاءة: ويتوقف على المستوى الذي يستطيع فيه الفرد تحقيق أهدافه التي تحدد سلوكه، والكافح من أجل تحقيق هذه الأهداف وإنجازها.

- الشعور بالقيمة: وهي إحساس الفرد بقيمة من خلال تفاعله مع الآخرين، فشعور الفرد بالاهتمام والتقبل من قبل الآخرين يولد لديه إحساساً بالقيمة على نحو يرفع من تقديره لذاته.

ويلعب إدراك الفرد لذاته دوراً كبيراً في تشكيل تقدير الذات لديه (Engler, 1991)، ويعتبر الشخص الذي لديه تقدير ذات إيجابي، بأنه الذي يرى نفسه شخصية مهمة وذات قيمة، وأنه يستحق� الاحترام والتقدير، كما أنه يؤثر على الناس والأحداث، ويعتبر تقدير الذات أحد متغيرات الشخصية المهمة التي تم تناولها بالبحث والدراسة في علاقتها بالمتغيرات المختلفة لدى الأفراد

ثالثاً: الأعراض الاكتئابية :

تعد الأعراض الاكتئابية أحد الأضطرابات النفسية التي يواجهها الفرد، خصوصاً في العصر الحديث الذي يحتوي على الكثير من الضغوط فالاكتئاب يمثل خبرة سيئة لها آثارها السلبية على الفرد فهو يقف خلف العديد من المشكلات التي يعاني منها الأفراد، وتتضح من خلال الشعور بالحزن واليأس وتدنى الطاقة الجسمية والصعوبات المعرفية، بالإضافة إلى الشعور بالذنب وتدنى احترام الذات (أحمد عبد الخالق، على كاظم، غادة عيد ٢٠١١)

وقد تناول العديد من الباحثين والمؤسسات دراسة الأعراض الاكتئابية وتعريفها ومنها أنها اضطرابات نفسية تتصف بحدوث انخفاض كبير في الطابع المزاجي للفرد، وبفقدان

الاهتمام أو الاستمتاع بالنشاطات اليومية، ويحدث تغيرات في الوزن والشهية للطعام، والأرق أو كثرة النوم، والتعب أو فقدان الطاقة والإجهاد، والشعور بالضعف والذنب، وتناقص القدرة على التفكير والتركيز، والتتردد وعدم الجسم، والتفكير بالموت والانتحار (American Psychiatric Association, 2000, 349).

ويشير الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية والعقلية إلى أن اضطرابات الاكتئاب تميز بوجود خمسة أو أكثر من الأعراض الاكتئابية تمتد لأسبوعين على الأقل، يختلف فيها الفرد عما كان عليه نشاطه السابق، وتتضمن الأعراض كلاً أو أحد هذين العرضين: مزاج مكتئب، أو فقدان الاهتمام في جميع الأنشطة تقريبًا، يرافقه أربعة على الأقل من أعراض الاكتئاب، والسمة الرئيسية للاكتئاب أنها تمتد لفترة أسبوعين على الأقل (American Association Psychiatric, 2013) ، وهذه الأعراض هي :

الأعراض المعرفية: والتي تمثل في القدرات المعرفية للأفراد ومنها اضطراب في التفكير والتذكر والانتباه واتخاذ القرارات والتي تؤثر على قدرة الفرد على التعلم والتحصيل، وقد يشعر الفرد بالعجز عن إدارة حياته وحل مشكلاته (Watkins & Hammen, 2018, 34).

الأعراض العاطفية: يعبر الاكتئاب من الاضطرابات النفسية، والتي لها تأثير على العاطفة أو المزاج؛ ومنها الشعور بالحزن، والمزاج المكتئب ، والشعور بفقدان المتعة في الحياة

الأعراض السلوكية: يؤثر الاكتئاب على النواحي المختلفة من حياة الفرد، وينعكس ذلك على تصرفاته وسلوكيه؛ فتضعف قدرته على العمل، وقد يرفض الذهاب إليه، وتبعد على وجهه علامات الحزن والكآبة، ويتصف أيضًا بمرض الاكتئاب بالهياب الحركي، والكسيل العام، وقد تدهور حاليه فتصل إلى التوقف عن الحركة والكلام وال الطعام والشراب.

الأعراض الجسدية والألام العضوية: تعد الأعراض الجسمية من أكثر الأعراض شيوعاً؛ فيكون الفرد المكتئب كثير الشكوى الجسمية ، دون أن يكون هناك أسباب عضوية واضحة لذلك ؛ ومن هذه الأعراض الصداع والشعور بالألم والقولون العصبي وفقدان الشهية والنوم(وفيق مختار ٢٠١٧: ٤٤).

رابعاً: قلق الموت

يعد قلق الموت نوع من القلق العام الذي يتميز بمستويات عالية وثابتة من القلق المفرط على العديد من الظروف الحياتية، التي تستمر لأكثر من أيام أو حتى شهور، وهذه المخاوف هي كبيرة بما يكفي لتسبب مشاكل في الحياة اليومية، تكون مصحوبة باستجابات فسيولوجية مثل: سرعة خفقان القلب- توتر العضلات والأرق- ضعف التركيز والعصبية (David sue & Othere, 2010, 138).

ويُعرف قلق الموت على أنه الحالة النفسية التي تصيب الإنسان نتيجة لجتماع مجموعة من العوامل الإدراكية والجسدية والسلوكية، وتؤدي إلى شعور هذا الإنسان بحالة من عدم الراحة النفسية وسيطرة الخوف والتوتر والتrepid علىه، ولا يمكن للإنسان القلق تحديد سببه تحديدًا دقيقًا وقد يظهر القلق على هيئة توتر واضح على الإنسان، وببقى هذا التوتر لفترات طويلة نتيجة لشعور هذا الإنسان بأنه قد يتعرض لنوع من أنواع الخطير، وفي بعض الحالات يكون



الخطر موجوداً بالفعل، وحالات أخرى يكون مجرد تخيل وأوهام يصاب بها الإنسان، وتؤدي إلى إصابته بحالة من القلق الشديد، والذي يؤثر سلباً على مجريات حياته (Kimberly Holland, 2016)، وقلق الموت هو حالة يعاني فيها الناس من ردود فعل عاطفية سلبية (Brady, 2015)، ويتم فحص قلق الموت من عدة أطريق محاولة لفهمه بشكل أفضل من خلال منظور سلوكي (Hoelterhoff, 2015).

ويشار إلى هذا المفهوم أيضاً باسم رهاب الموت (الخوف من الموت)، مع تقدم المرض والأعراض المرتبطة به يختفي مرضي السرطان في معظم الحالات من الأبعاد المذكورة لقلق الموت حيث لا يمكن أن يتسبب هذا القلق في حدوث اضطرابات جسدية وعقلية لدى المرضى فحسب بل يؤثر أيضاً على نوعية حياتهم وبالتالي فإن التعرف على العوامل التي قد يكون لها تأثير على نوعية حياة هؤلاء المرضى وتحديدها أمر ضروري، مثل أشكال القلق الأخرى، فإن القلق من الموت يؤثر على الصحة العقلية، وهذه القضية ذات أهمية كبيرة لدرجة أن قلق الموت هو أحد أهم القضايا التي أثيرت في العلاج النفسي وأن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع قلق الموت يعانون أيضاً من اضطرابات أخرى مصاحبة لها مثل الوسواس القهري (Karampour, et al., 2018, 61-63).

يتضح مما سبق أن الأطفال المصابون بمرض السرطان أكثر تعرضاً للاضطرابات السابقة وهي اضطراب التواصل الاجتماعي وذلك لأنهم يعانون من صعوبات مستمرة ودائمة في الاستخدام الاجتماعي للتواصل اللغطي، كذلك انخفاض القدرة على تغيير طرق التواصل لتتناسب مع السياق، كما أنهم يعانون من ضعف تقدير الذات وذلك لنظرتهم السلبية لأكثر من جانب والتي منها مجال الصحة الجسمية لهم حيث أنهم يعانون من مشكلات جسدية، كذلك يشعرون بضعف بالكافاء الذاتية، كما أنهم يعانون من مشاعر الاكتئاب وقلق الموت وذلك لأن الاكتئاب يؤثر على النواحي المختلفة من حياتهم، كما أن شدة المرض يجعلهم يعانون من قلق الموت بصفة مستمرة.

دراسات سابقة: صنفت الدراسات السابقة إلى المحاور التالية:

المحور الأول : دراسات تناولت اضطراب التواصل لدى أطفال مرضى السرطان

هدفت دراسة (Enskar & Essen, 2008) إلى التعرف على المشاكل الجسمية والنفسية والاجتماعية لدى أطفال السرطان وإجراء مقارنة بين الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج والأطفال المستمررين في تناول جرعات العلاج، وتكونت عينة الدراسة من 39 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين (7-12) عام، وتمثلت المشاكل الجسمية في (التعب - سقوط الشعر - القيء - الألم - اضطرابات الأكل) أما المشاكل النفسية والاجتماعية فتمثلة في المخاوف المرضية عند الحقن، وعند الذهاب للمستشفى، والإحساس بالعزلة بين جدران غرفتها بالمستشفى، والشعور بالوحدة واضطرابات التواصل والقلق والحزن. وقد أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يتلقون العلاج أكثر عرضة لمثل تلك الإضطرابات الجسمية والنفسية مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج ولا يوجد فروق دالة بين الذكور والإناث.

كما أثبتت دراسة (Ohndley et al, 2016) أن أطفال السرطان يظهرون صعوبات اجتماعية وانفعالية وسلوكية متزايدة، فقد يظهر هؤلاء الأطفال قصوراً في التفاعل واضطراب اللغة

النوعي ومعدلات منخفضة من التواصيل الفظي مع أقرانهم، وانخفاض اللعب التفاعلي،
وتجاهل الآقران

فيما ذكرت دراسة (Helland, 2017) أن الأطفال ذوي اضطراب اللغة النوعي أكثر عرضة لخطر التباعد الاجتماعي وانخفاض التحصيل الدراسي، ومشكلات في التعبير عن المشاعر والانفعالات والمهارات السلوكية، حيث أن حوالي (35 - 50 %) من الأطفال ذوي اضطراب اللغة النوعي يعانون من مشكلات في التعبير عن المشاعر والانفعالات والمهارات السلوكية.

المحور الثاني: دراسات تناولت تدنى تقدير الذات لدى أطفال مرضى السرطان:

تناولت دراسة (Von Essen, et al, 2000) تقدير الذات والاكتئاب والقلق بين الأطفال والراهقين السويديين أثناء علاج السرطان وبعده و معرفة هل الفترة التي تلي إنتهاء العلاج تميز بارتفاع مخاطر حدوث مشاكل (نفسية - اجتماعية) مقارنة بفترة العلاج الفعلية؟ ، حيث قدم الباحثون مقاييساً عن تقدير الذات والاكتئاب والقلق وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 51 من الأطفال والراهقين السويديين، تتراوح أعمارهم بين 18-8 سنة أثناء علاج السرطان (عدد = 16) وبعد العلاج (عدد = 35). والأدوات هي استخدام مقاييس التقرير الذاتي "أنا أعتقد أنني"، وقائمة اكتئاب الأطفال وقياس القلق الواضح للأطفال وتمت مقارنة البيانات مع البيانات التي حصل عليها آخرون سابقاً عنأطفال سويديين أصحابه، وأظهرت النتائج أنَّ الأطفال والراهقين الذين يتلقون العلاج لديهم مستويات عالية من ضعف تقدير الذات والاكتئاب والقلق مقارنة بمستويات الأطفال الأصحاء. كما توصلت النتائج إلى أن الفترة التي تلي إنتهاء العلاج تميز بارتفاع مخاطر حدوث مشاكل نفسية - اجتماعية مقارنة بفترة العلاج الفعلية.

بينما تصدت دراسة (Ritchie, 2001) للكشف عن تقدير الذات والأمل عند المراهقين المصابين بالسرطان وذلك لمعرفة الاستجابة النفسية والاجتماعية وتجربة العلاج لدى المراهقين المصابين بالسرطان ، حيث قام بدراسة الأداء النفسي والاجتماعي للراهقين أثناء تجربة العلاج والتكيف طويلاً الأمد مع الناجين من السرطان والارتباط الوصفي لهذه العلاقات بين مراحل المراهقة والنوع وتقدير الذات والأمل في عينة من 45 مراهقاً مصاباً بالسرطان. والأدوات هي قياس المستوى الملحوظ لتقدير الذات باستخدام قائمة Coopersmith لتقدير الذات، وتم قياس الأمل باستخدام مقاييس الأمل للراهقين. وتوصلت النتائج إلى أنه لم يختلف المستوى الملموس من تقدير الذات والأمل بشكل كبير بين الذكور والإإناث بشكل عام، والراهقون المبكر و المتوسطون والتأخر و بين الذكور والإإناث في مرحلة المراهقة.

والخلاصة هي أن هذه الدراسة تساهم في تعزيز معرفة الاستجابة النفسية والاجتماعية وتجربة العلاج لدى المراهقين المصابين بالسرطان. يمكن استخدام هذه النتائج في البحث المستقبلي لتطوير واختبار إجراءات التمريض التي يمكن أن تؤثر على الإحساس المتصور بتقدير الذات والأمل وقد تسمع بالتطور النفسي والاجتماعي المستمر والتعامل الفعال بين هؤلاء المراهقين أثناء العلاج والبقاء على قيد الحياة.

وهدفت دراسة (Bragado, 2008) إلى معرفة مفهوم الذات الجسمية والقلق والاكتئاب وتقدير الذات لدى الأطفال المصابين بالسرطان والأطفال الأصحاء دون تاريخ مرضي بالسرطان وإلى اختبار ما إذا كان الأطفال المصابون بالسرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي



يظهرون مفهوماً جسدياً ضعيفاً للذات، وتقديرها أقل للذات، ومزيداً من القلق والاكتئاب مقارنة بالأطفال الأصحاء (الذين ليس لديهم تاريخ مرضي بالسرطان) في نفس الفئة العمرية (9-16) سنة) والحالة الاجتماعية ، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من 120 طفلاً، باختبار 30 طفلاً مصاباً بالسرطان و 90 طفلاً يتمتعون بصحة جيدة علاوة على ذلك، تم استخدام استماراة تحليل مفهوم الذات وتقدير الذات على التنبؤ بالكرب العاطفي. وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين وكان تقدير الذات هو أكبر مؤشر على الاكتئاب .

المحور الثالث: دراسات تناولت الأعراض الاكتئابية لدى أطفال مرضى السرطان:

حيث هدفت دراسة (Sharon et al 1990) إلى معرفة الأعراض الاكتئابية لدى الأطفال المصابين بالسرطان حديثي التشخيص. وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من (59) من الأطفال ممن يتراوح أعمارهم ما بين (3-18) سنة، حيث قام الباحثون بتطبيق العديد من المقاييس الخاصة بالسلوك من خلال أولياء أمور الأطفال، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة معاناة الأطفال حديثي التشخيص المصابين بالسرطان العديد من المشكلات السلوكية، وأن هناك علاقة بين المشكلات السلوكية للطفل والأباء الذين لديهم اكتئاب. كما أن عنابة الوالدين بالأطفال المصابين تقلل من حدة المشكلات والضغوط على الأطفال المصابين بالسرطان .

كما هدفت دراسة (Zaher, et al 1994) إلى معرفة مدى تأثير المرض المزمن على خصائص شخصية الأطفال المرضى وأمزجتهم ، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من (25) طفلاً من الأطفال المصابين بعيوب خلقية (25) طفلاً من المصابين بالسرطان (25) طفلاً من الأسوبياء وتراوحت أعمار الأطفال بجميع العينات من سن (3-6) سنوات طبق عليهم مقياس الشخصية للأطفال ما قبل المدرسة بالإضافة إلى استبيان إدراك ولـ الأمر لأمزجة الأطفال من وجہة نظر أميائهم. وقد أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في متغيرات المثابرة وعدم التحمل وعدم الانتظام وصعوبات التكيف لصالح الأطفال المرضى، ولا توجد فروق بين الذكور والإإناث ، ويعاني أطفال مرضى السرطان أكثر من الأطفال العاديين في كل المتغيرات السابقة .

بينما تصدت دراسة (Mulhern, et al, 1994) إلى كشف العلاقة بين المرض الجسيمي والأعراض الاكتئابية حيث قام الباحثون بتقييم حدة الأعراض الجسمية والاكتئابية لدى (92) طفلاً من المصابين بالسرطان تتراوح أعمارهم ما بين (8-16) عاماً واستخدم الباحثون في هذه الدراسة مقياس اكتئاب لدى الأطفال ومقاييس التقارير الأمومية عن الاكتئاب لدى الطفل وكذلك قائمة ملاحظة السلوك وتقييمات الألم ،

وقد أشارت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى ظهور أقل من (10%) من أفراد عينة الدراسة أعراضًا أعلى من عتبة تشخيص الإكتئاب المعتمد. كما أبدي (40%) من أفراد عينة الدراسة تغييرات في حدة الأعراض الاكتئابية وفقاً لتغير حدة الأعراض الجسمية. ويوضح للقاريء من خلال الفقرات السابقة أن للمرض المزمن تأثيراً على خصائص شخصية الأطفال المرضى وأمزجتهم ، وأن أطفال مرضى اللوكيميا يعانون من ذلك. كذلك اتضح أن هناك علاقة بين المرض الجسيمي والأعراض الاكتئابية بنسبة كبيرة.

وقد هدفت دراسة قام بها (Awad Salhi & Khatib, 2003) إلى قياس مدى الاكتئاب، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من (100) مريض بالغ في مركز الحسين للسرطان موزعين على أنواع السرطان المختلفة (40) ذكور و(60) إناث، تعرضوا لأنواع مختلفة من أشكال العلاج. تم تطبيق مقاييس متعددة من مقاييس الاكتئاب المطورة، وقد أشارت النتائج إلى أن (70%) من المرضى يشكون من الاكتئاب، وكانت السمات الأكثر شيوعاً لدى العينة هي بالترتيب (القلق- الخوف- الألم - الحزن- الإرهاب). كذلك أشارت الدراسة إلى أن أهم السمات النفسية والعقلية لدى مرضى السرطان هي عادة القلق واليأس بشكل عام. والمرضى الذين هم في أعلى درجات الخطر من اليأس هم أولئك الذين لديهم تاريخ مضطرب وسرطان متقدم ، ويسيطران بشكل ضعيف على الألم. ويرى البحث أنه من (38_24%) من مرضى السرطان يشكون من مستويات من القلق واليأس.

المحور الرابع: دراسات تناولت قلق الموت لدى أطفال مرضى السرطان:

أجرى (Chen et al: 2000) دراسة على مرضى تم تشخيصهم بأنواع مختلفة من السرطان في تايوان وذلك لقياس القلق والاكتئاب على المرضى الذين يعانون من ألم ، وأخرين من لا يشعرون بألم، تألفت العينة من 77 مريضاً عانوا من آلام خلال أسبوع مضى، و 126 مريضاً من لم يعانون من الآلام خلال أسبوع سابق للمقابلة . وكانت العينة من المرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم على علم بطبيعة مرضهم، وكان يشترط في العينة لا يكون المرض منتشرة إلى الدماغ، وأن يتسموا بالوعي والقدرة على التواصل ، وأشارت النتائج إلى أن نسبة القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين كانوا يعانون من الألم 17.7 % - 23.7 % على التوالي ، وهي أكثر من نسبة الذين لم يعانون من الألم في تلك الفترة والذين كانت نسبة القلق والاكتئاب لديهم على التوالي: 11.8% - 20.2% .

قام (Limbos et al, 2000) بدراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين الوظائف النفسية وجودة الحياة لدى (36) مريضاً بسرطان الرئة قبل نقل أعضاء لهم و(73) تم نقل أعضاء لهم، طبق عليهم عدة مقاييس منها مقاييس جودة الحياة، وتقدير الذات لروزنبرغ والقلق والاكتئاب، وجدوا أن العينة التي لم تجرى نقل الأعضاء لهم أفضل شعوراً بجودة الحياة، وتقديرًا لذاته من المجموعة التي أجرت نقلًا للأعضاء، وعلى الرغم من ذلك فحالتهم النفسية جميعاً ليست جيدة، حيث أنهم كانوا أقل من المستوى العادي في فترة تقدير الذات بفارق جوهري عند مستوى (0.05).

وأجرى (Gardiner et al, 2010) دراسة عن التعامل مع مرض السرطان الرئوي المزمن المتقدم ، وتكونت العينة من (21) مريضاً مصاباً بالأنسداد الرئوي المزمن بحالاته المقاومة من حيث شدة المرض تم مقابلتهم ودراسة حالتهم ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المرضى كانت لديهم مخاوف وقلق من الموت، وخاصة فيما يتعلق بكيفية موتها بسبب ضيق التنفس، حيث كانت هذه الفكرة هي المهيمنة والمؤدية لقلق الموت لديهم.

وقد هدفت دراسة (Hakami, 2010) إلى التعرف على المشكلات النفسية لدى الأطفال المصابين بالسرطان، وتم عمل عدد من المقابلات الكlinيكية مع مجموعة من الأطفال ، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من (35) طفلاً وكان يتراوح عمر العينة من (6-17) سنة،



وقد كان من نتائج الدراسة أن الكبت، القلق من الموت يُعدان من أهم الآثار النفسية المترتبة على الإصابة بمرض السرطان.

وقام (Laub Huizenga, 2011) بدراسة عن "دور التعبير العاطفي في كتابات المراهقين من الوالدين مع مرض السرطان و معرفة دور التعبير العاطفي في كتابات الأطفال المراهقين من الآباء والأمهات مع مرض السرطان. حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من عدد 40 مراهقاً والذين تراوح أعمارهم من (12-18) سنة وتم اختيار العينة عشوائياً، وذلك لكتابته في 3 محاور أساسية عن أفكارهم ومشاعرهم بشأن السرطان (حالة تجريبية)، الصحة الجسدية (أي زيارات الطبيب، الغياب المدرسي، الأعراض الجسمية)، والمتغيرات الصحة النفسية (الاكتئاب والقلق، والعاطفة الإيجابية، العاطفة السلبية، الصدمة). واستنتجت الدراسة أن عينة الدراسة تعاني من وجود أعراض للقلق والاكتئاب بدرجة عالية.

ومن الدراسات في هذا المجال دراسة (Spinetta&Malony, 2008) بعنوان قلق الموت لدى مرضى السرطان، وكانت العينة مكونة من مجتمعتين الأولى مرضى السرطان والثانية وهي المجموعة الضابطة أطفال يعانون من أمراض مزمنة وغير مميتة. وأظهرت النتائج أن الأطفال المصابين باللوكيميا يعانون القلق بشكل كبير ولا توجد فروق بين الذكور والإإناث، ويظرون أيضاً نقص في القدرة على التكيف مع ضرورة الزيارات أو متابعة العلاج الإكلينيكي ويظرون ازيداً من القلق مع تكرار العلاج الإكلينيكي وطول فترة المرض.

ويندرج تحت هذه الفتنة دراسة (Lubis, Siregar, 2015) التي أجريت على عينة مكونة من 46 طفلاً من أطفال مرضى السرطان ، تراوحت أعمارهم بين (5 - 18) عاماً بالمقارنة بعينة من الأطفال الأصحاء وذلك بهدف فحص الفريق في نوعية الحياة والتتفاؤل والأمل والتسامح وعلاقتها بمشاعر القلق والاكتئاب واليأس لدى هؤلاء الأطفال، وتم استخدام مقاييس التفريح الذاتي الخاصة بنوعية الحياة ، والأمل والتسامح والتتفاؤل والقلق والاكتئاب واليأس ، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية سلبية بين الأمل ، والتسامح ، والتتفاؤل وكل من القلق ، والاكتئاب واليأس ، كذلك وجدت فروق بين الأطفال المرضى والأطفال الأصحاء حيث ارتفعت درجات القلق والاكتئاب ، واليأس لدى الأطفال المرضى وانخفضت درجات الأمل ، والتتفاؤل ، والتسامح بعكس الأطفال الأصحاء.

تعقيب عام

- اتفقت معظم دراسات وبحوث المحور الأول على أن أطفال مرضى السرطان يعانون من اضطراب التواصل، وظهور لديهم أعراض مصاحبة مثل التعب واضطرابات الأكل مقارنة بالأطفال العاديين مثل دراسة (Enskar & Essen, 2008) ودراسة (Ohndley et al, 2016) ودراسة (Helland, 2017) كما أظهرت النتائج أن أطفال مرضى السرطان يعانون من مشكلات في التعبير عن المشاعر والانفعالات وبعض الإضطرابات الجسمية والنفسية مقارنة بالأطفال العاديين.

- تناولت دراسات المحور الثاني العلاقة بين تقدير الذات ومرض السرطان حيث أظهرت النتائج أن أطفال مرضى السرطان لديهم تقدير ذات منخفض مقارنة بالأطفال العاديين ، وأن متغير تقدير الذات هو مؤشر على الاكتئاب أكثر من القلق والخوف وغيره من الإضطرابات النفسية مثل دراسة (Ritchie, 2001) ودراسة (Bragado, 2008) ودراسة (Von Essen, et al, 2000).

- و جاءت دراسات المحور الثالث لمعرفة الأعراض الاكتئابية التي يعاني منها أطفال السرطان ، وكذلك معرفة بعض اضطرابات السلوكية وتأثير المرض على أمزجة الأطفال ، والعلاقة بين المرض الجسدي والأعراض الاكتئابية مثل دراسة (Zaher, et al 1990) ودراسة (Sharon et al 1990) ودراسة (Awad Salhi & Khatib 1994) ودراسة (Hakami, 2010) (Spinetta&Malony,2008) ، (Lubis, Siregar,2015) .

- وأشارت دراسات المحور الرابع إلى التعرف على بعض المتغيرات التي يعاني منها مريض السرطان ومنها قلق الموت والذي يرجع إلى أن المريض دائمًا يشعر بأنه سيتهي عمره جراءأخذ كميات كبيرة من الكيماوي والتي يتربّط بها آثار نفسية سلبية على الطفل بالإضافة إلى متغيرات مصاحبة مثل الاكتئاب والخوف، وهذا ما وجد في دراسة (Chen et al: 2000) ودراسة (Hakami, 2010) (Spinetta&Malony,2008) ودراسة (Lubis, Siregar,2015) .

فروض البحث

يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:

- 1 توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقياس اضطراب التواصل في إتجاه أطفال مرضى السرطان.
- 2 توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقياس تقدير الذات المنخفض في إتجاه أطفال مرضى السرطان.
- 3 توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقياس الأعراض الاكتئابية في إتجاه أطفال مرضى السرطان.
- 4 توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقياس قلق الموت في إتجاه أطفال مرضى السرطان.
- 5 لا توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي رتب درجات أطفال مرضى السرطان الذكور والإإناث على مقاييس اضطرابات النفسية .

إجراءات البحث

- 1- **منهج البحث:** تم الاستناد إلى المنهج الوصفي حيث يُعد المنهج الوصفي والطريقة المقارنة هو المناسب في وصف البحث الحالي؛ نظرًا لأنَّه يتمثَّلُ مع طبيعة أهداف هذا البحث.
- 2- **المشاركون في البحث:** تم اختيار المشاركين في البحث من أطفال مرضى السرطان بمستشفى دار السلام للأورام بالقاهرة والأطفال العاديين من مدرسة المنشاوي الجديدة للتعليم الأساسي، ويبلغ عددهم (80) بواقع (50) مرضى السرطان ، (30) أطفال عاديين.
- 3- **أدوات البحث:** لتحقيق نتائج البحث قام الباحث باستخدام المقاييس التالية:
 - أ- مقياس اضطرابات التواصل لدى مرضى السرطان إعداد الباحث الأول.
 - ب- مقياس تقدير الذات المنخفض لدى أطفال مرضى السرطان إعداد الباحثين.
 - ج- مقياس الأعراض الاكتئابية لدى أطفال مرضى السرطان إعداد الباحثين.



د- مقياس قلق الموت لدى أطفال مرضى السرطان إعداد الباحثين .

وتم التأكيد من الخصائص السيكومترية للمقياس:

1- الاتساق الداخلي

قام الباحثون بحساب معاملات الاتساق الداخلي لعبارات كل مقياس فرعى من مقياس الاضطرابات النفسية لبيان مدى الترابط بين عبارات كل مقياس والدرجة الكلية على نفس المقياس، للتعرف على صدق البناء بصورة أدق، وذلك على النحو التالي:

جدول (1):

معاملات الاتساق الداخلي على مقياس الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان (ن=50)

مقاييس قلق الموت	مقاييس الأعراض الاكتابية	مقاييس تقدير الذات المنخفض	مقاييس اضطراب التواصل				
معاملات الارتباط العبارة	رقم العبارة	معاملات الارتباط العبارة	رقم العبارة	معاملات الارتباط العبارة	رقم العبارة	معاملات الارتباط العبارة	رقم العبارة
0,193	1	0,132	1	*,.359	1	,055	1
*0,405	2	**0,466	2	,188	2	**0,423	2
**0,591	3	*0,344	3	**0,463	3	**0,536	3
*0,335	4	**0,383	4	**0,453	4	**0,509	4
*0,329	5	**0,485	5	0,277	5	0,207	5
*0,279	6	**0,553	6	0,113	6	0,131	6
0,152	7	*0,339	7	0,257	7	*0,327	7
*0,279	8	**0,545	8	*0,296	8	0,245	8
**0,349	9	0,180	9	**0,459	9	*0,395	9
0,273	10	**0,480	10	**0,485	10	**0,546	10
*0,304	11	**0,505	11	0,249	11	098	11
**0,456	12	**0,486	12	**0,404	12	**0,473	12
**0,451	13	0,173	13	0,143	13	**0,634	13
**0,368	14	**0,509	14	**0,614	14	0,201	14
**0,384	15	,063	15	**0,576	15	**0,379	15
091	16	**0,391	16	**0,413	16	0,211	16
				**382	17		

يلاحظ من الجدول (1) أن كل معاملات الارتباط لكل مقاييس دالة عند مستوى 0,01 ما عدا العبارة رقم

الفروق في بعض الاضطرابات النفسية
لدى أطفال مرضى السرطان والعابدين

(16,14,11,8,6,5,1) في مقاييس اضطراب التواصل ، وعبارة رقم (13,11,7,6,5,2) في
مقاييس تقدير الذات المنخفض ، وعبارة رقم (15,13,9,1) في مقاييس الأعراض الاكتئابية ،
وعباره رقم (10,7,1,16) في مقاييس قلق الموت فجميعها غير دالة وتم استبعادها من المقاييس.

2- الصدق:

للتأكد من صدق مقاييس الاضطرابات النفسية تم حساب الصدق التمييزي لعبارات مقاييس:

وذلك على النحو التالي:

جدول (2) :

معاملات الصدق التمييزي لعبارات مقاييس الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان
(ن=50)

		قلق الموت		الأعراض الاكتئابية		تقدير الذات المنخفض		اضطراب التواصل	
معامل التمييز	رقم العبارة	معامل التمييز	رقم العبارة	معامل التمييز	رقم العبارة	معامل التمييز	رقم العبارة	معامل التمييز	رقم العبارة
,21	1	,18	1	,24	1	,21	1		
,23	2	,23	2	,24	2	,24	2		
,23	3	,22	3	,20	3	,22	3		
,19	4	,19	4	,19	4	,19	4		
,24	5	,24	5	,18	5	,7	5		
,25	6	,24	6	,25	6	,5	6		
,23	7	,24	7	,23	7	,19	7		
,24	8	,19	8	,22	8	,10	8		
,24	9	,24	9	,19	9	,24	9		
,23	10	,24	10	,23	10	,24	10		
,23	11	,24	11	,24	11	,21	11		
,24	12	,24	12	,24	12	,21	12		
,19	13	,23	13	,24	13	,23	13		



قلق الموت		الأعراض الاكتنابية		تقدير الذات المنخفض		اضطراب التواصل	
,12	14	,24	14	,20	14	,12	14
,19	15	,10	15	,19	15	,19	15
,73	16	,22	16	,20	16	,13	16
,38							17

يلاحظ من الجدول السابق تدني قيمة معاملات التمييز لبعض العبارات، وتم استبعاد العبارة التي قل معامل التمييز لها عن 19 ، حيث تم استبعاد عبارة رقم (16.14.8.6.5) في مقاييس اضطراب التواصل ، كما تم استبعاد عبارة رقم (5) في مقاييس تقدير الذات المنخفض، واستبعاد عبارة رقم (15.1) في مقاييس الأعراض الاكتنابية . هذا غير مفهوم

3- الثبات:

قام الباحثون بحساب ثبات المقياس من خلال:
طريقة ألفا كرونباخ:

تم استخدام معامل الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس، والجدول التالي يوضح قيم الثبات لابعاد مقاييس اضطرابات التواصل:
جدول (3):

معاملات الثبات لمقياس اضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان باستخدام معامل ألفا-كرونباخ (ن=50)

المعيار	معامل الثبات
المقياس الأول: اضطراب التواصل	**0,510
المقياس الثاني: تقدير الذات المنخفض	**0,545
المقياس الثالث: الأعراض الاكتنابية	**0,666
المقياس الرابع: قلق الموت	**0,549

يتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ مرتفعة نسبياً مما يدل على تمتّع المقياس بدرجة عالية من الثبات واستخدامه في الدراسة الحالية .

نتائج البحث

نتائج الفرض الأول ومناقشتها:

ينص الفرض الأول على أنه "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقاييس اضطراب التواصل في إتجاه أطفال مرضى السرطان". وللحقيقة من صحة هذا الفرض قام الباحثون حساب الآتي:

جدول (4):

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" ودلالتها الإحصائية في الفروق بين أطفال مرضى السرطان (ن=50) وأطفال العاديين (ن=30) على مقاييس اضطراب التواصل الاجتماعي

	المقاييس	أطفال مرضى السرطان								
		الأطفال العاديون	قيمة	مستوى	المتوسط	انحراف المعياري	المتوسط	انحراف المعياري	"ت"	الدلالة
	اضطراب التواصل الاجتماعي				14,780	2,188	12,600	1,958	4,483	,01

يتضح من جدول (4) أن قيمة "ت" للفروق بين أطفال مرضى السرطان وأطفال العاديين في اضطراب التواصل بلغت (4,483)، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (.01)؛ حيث أن اتجاه الفروق لصالح أطفال مرضى السرطان ، وقد أرجع الباحثون هذا إلى أنهم يعانون من مشكلات نفسية تجعلهم مضطربين دائماً نتيجة لتواجدهم المستمر داخل المستشفى وتظهر لديهم أعراض مصاحبة مثل التعب واضطرابات الأكل مقارنة بالأطفال العاديين مثل دراسة (Enskar & Essen, 2008) ودراسة (Ohandley et al, 2016) ودراسة (Helland, 2017) كما أن أطفال مرضى السرطان يعانون من مشكلات في التعبير عن المشاعر والانفعالات وبعض الإضطرابات الجسمية والنفسية مقارنة بالأطفال العاديين.

نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:

ينص الفرض الثاني على أنه "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقاييس تقدير الذات المنخفض في إتجاه أطفال مرضى السرطان".

وللحقيقة من صحة هذا الفرض قام الباحثون بحساب قيمة ت كما يلى :

جدول (5):

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" دلالتها الإحصائية في الفروق بين أطفال مرضى السرطان (ن=50) والأطفال العاديين (ن=30) على مقياس تقدير الذات المنخفض

المقياس	أطفال مرضى السرطان الأطفال العاديين					
	قيمة مستوى	"ت" الدلالة	انحراف المعياري	المتوسط المعياري	انحراف المعياري	المتوسط
تقدير الذات المنخفض	,05	2,313	2,411	17,100	2,564	14,440

يتضح من جدول (5) أن قيمة "ت" للفروق بين أطفال مرضى السرطان والأطفال العاديين في تقدير الذات المنخفض بلغت (2,313) ، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0,05)؛ حيث أن اتجاه الفرق في تدني تقدير الذات لصالح أطفال مرضى السرطان ، وهذا يعني أن هؤلاء الفتاة يعانون من انخفاض في تقدير ذاتهم وأرجع الباحثون هذا إلى أنهم يتعرضون للتغيرات في وزن الجسم وصورته وسقوط الشعر وأصفرار الوجه وغيرها. وهذا يجعل لديهم تقدير ذات منخفض مقارنة بالأطفال العاديين الذين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات وهي دراسة (Ritchie, 2001) ودراسة (Bragado, 2008) ودراسة Von (Essen, et al, 2000).

نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

ينص الفرض الثالث على أنه توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقياس الأعراض الاكتئابية في إتجاه أطفال مرضى السرطان .

وللحقيقة من صحة هذا الفرض قام الباحثون حساب الآتي :

جدول (6):

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" دلالتها الإحصائية في الفروق بين أطفال مرضى السرطان (ن=50) والأطفال العاديين (ن=30) على مقياس الأعراض الاكتئابية

المقياس	أطفال مرضى السرطان الأطفال العاديين					
	قيمة مستوى	"ت" الدلالة	انحراف المعياري	المتوسط المعياري	انحراف المعياري	المتوسط
الأعراض الاكتئابية	,05	2,239	3,242	17,633	2,765	19,160

يتضح من جدول (6) أن قيمة "ت" للفروق بين أطفال مرضى السرطان والأطفال العاديين في الأعراض الاكتئابية بلغت (2,239) ، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (0,05)؛ حيث أن اتجاه الفرق في الأعراض الاكتئابية لمرضى السرطان ، وقد أرجع الباحثون هذا إلى أن هؤلاء

الفئة عندما يصابون بها المرض فإنه يزيد نسبة القلق لديهم إذ يغير نمط حياتهم الشخصية ومع عائلاتهم وأقرانهم، وأيضاً الأثار الناجمة عن العلاج بالإشعاع الكيماوي، وكذلك الخوف من التغييرات الجسدية، وهذا ما تناوله دراسة (Chen et al: 2000) ودراسة (Hakami, 2010) ودراسة (Lubis, Siregar, 2015) ، ودراسة (Spinetta&Malony, 2008) .

نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:

ينص الفرض الرابع على أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أطفال مرضى السرطان والعاديين على مقاييس قلق الموت في إتجاه أطفال مرضى السرطان .

وللحقيقة من صحة هذا الفرض قام الباحثون حساب الآتي:

جدول (7):

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" ودلالة الإحصائية في الفروق بين أطفال مرضى السرطان (ن=50) وأطفال العاديين (ن=30) على مقاييس قلق الموت

المقياس	أطفال مرضى السرطان			الأطفال العاديين			قيمة دلالة "ت"	قيمة مستوى
	المتوسط	الانحراف المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	الانحراف المعياري		
قلق الموت	21,300	2,384	21,433	4,910	163, غ.	4,910		

يتضح من جدول (7) أن قيمة "ت" للفروق بين أطفال مرضى السرطان والأطفال العاديين في قلق الموت بلغت (163)، وهي قيمة غير دالة وبالتالي يتضح عدم تحقق هذا الفرض، واختلفت النتائج مع دراسة (Chen et al: 2000) ودراسة (Hakami, 2010) ودراسة (Lubis, Siregar, 2015) ، وقد أرجع الباحثون هذا إلى أن مريض السرطان غالباً ما يفك في قضايا الموت ومن ثم يكون عرضة أكثر للقلق وتصيبه جملة من مشاعر اليأس والإحباط والشعور بالتشاؤم أكثر من غيره من الأطفال الذين يصابون بالأمراض الغير مزمنة.

نتائج الفرض الخامس ومناقشتها:

ينص الفرض الخامس على أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات أطفال مرضى السرطان الذكور والإإناث على مقاييس الاضطرابات النفسية .

وللحقيقة من صحة هذا الفرض قام الباحثون حساب الآتي:



جدول (8):

متوازنات الرتب ومجموعها وقيمة (Z) ومستوى الدلالة في الفروق بين أطفال مرضى السرطان الذكور $N=13$ وإناث $N=17$

المقياس	الفئة	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
اضطراب التواصل	ذكور	24,41	805,50	0,745	غ. د
	إناث	27,62	469,50		
تقدير الذات المنخفض	ذكور	26,27	867,00	0,527	غ. د
	إناث	24,00	408,00		
الأعراض الاكتئابية	ذكور	24,88	821,00	0,422	غ. د
	إناث	26,71	454,00		
قلق الموت	ذكور	25,27	834,00	0,156	غ. د
	إناث	25,94	441,00		

يتضح من جدول (8) عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوازنات رتب درجات أطفال مرضى السرطان (الذكور وإناث) على مقاييس الأضطرابات النفسية (اضطراب التواصل - تقدير الذات المنخفض - الأعراض الاكتئابية - قلق الموت). وقد أرجع الباحثون هذا إلى أن أطفال مرضى السرطان (الذكور وإناث) لديهم نفس الخصائص وي تعرضون جميعاً لتلك الأضطرابات بصورة متقاربة وسلوكهم تجاه المرض متقاربة ولا توجد فروق جوهرية وهذا ما ظهر في دراسة (Ritchie, 2001) (Zaher, et al, 1994) (Enskar & Essen, 2008) (Spinetta&Malony,2008).

التوصيات

- الاهتمام بفئة أطفال مرضى السرطان وتقديم كل وسائل الدعم وتلبية حاجاتهم النفسية والصحية .
- إنشاء مراكز نفسية داخل المستشفيات الخاصة بالأورام وذلك لتقديم الاستشارة والدعم المتكامل .
- تقديم برامج إرشادية لأطفال مرضى السرطان تركز على الجوانب التربوية .

بحوث ودراسات مقتربة

- برنامج ترويжи لخفض الاضطرابات النفسية لدى أطفال مرضى السرطان .
- التعرف على المشكلات النفسية وعلاقتها بجودة الحياة لدى أطفال مرضى السرطان .
- برنامج إرشادي لخفض قلق الموت لدى أطفال مرضى السرطان .
- برنامج تدريبي في تحسين جودة الحياة لدى أطفال السرطان .



المراجع

أولاً: المراجع العربية

أحمد محمد عبد الخالق ، كاظم على، غادة عيد (2011) . العوامل المبنية بمستويات بعض الأعراض الاكتئابية لدى عينتين من الأطفال والراهقين بالكويت وعمان، مجلة جامعة دمشق.الأردن ، م 27 ، ع 3 ، ص 165 .

عبد الكريم جرادات (2006). العلاقة بين تقدير الذات والاتجاهات اللاعقلانية لدى الطلبة الجامعيين. المجلة الأردنية في العلوم التربوية، الأردن، (3)، 143-153.

عويد المشعان ، أمثال الحويلة (2013). الفرق بين نوعية الحياة لدى طلبة جامعة الكويت وفق الجنس والحالة الصحية. المجلة التربوية، جامعة الكويت، 26 (104)، 15-57.

ثانياً : المراجع العربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية

Abdelkareem .G .(2006) Relationship between self-esteem and irrational tendencies with the undergraduates. The Jordanian Journal of Educational Sciences.3(1),143-153.

Adam Childhood Cancer Society (2010). Introduction to childhood cancer. Extracted on: 11/11/2013. Available at the following link: <http://www.adamcs.org>.

Ahmed. M. A, Kazem. A, Gada. E (2011).The predictive factors of the levels of some of the depressed symptoms with two sample of children and adolescents in Kuwait and Oman, Journal of Damascus University.Jordan, V(27), (3), p 165.

Auied .EL. & Amthal . AL .(2013). The Difference between the type of life of Kuwait University students according to sex and health status . the Educational Journal,26(104),15-57.

ثالثاً : المراجع الأجنبية

American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders., (5th Ed). Washington,DC.

Awad, G., Khatib.J. & Salhi, R. (2003). Distress in cancer in-patients in K.H.C.C. A study using the Arabic -modified version of distress Thermometer in the King Hussein Cancer Center. Amman, Jordan.

Bragado, C., Hernández-Lloreda, M. J., Sánchez-Bernardos, M. L., & Urbano, (2008). Physical self-concept, anxiety, depression, and self-esteem in children with cancer and healthy children without cancer history. Psicothema, 20(3), 413-419.

Chen, L. (2011). Contingent Self-esteem in Chinese Early and Late Adolescents, Master, Dissertation,Faculty of the Graduate of the University of Kansas

-
- Engler, B. (1991), *Personality Theories: an introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company. Gross, M. (1997). The effects of ability grouping on the academic and social development of gifted children, Seminar paper, GERRIC, UNSW.
- Ensker, Karin, R.N. & Essen, Louise, Von (2008). Physical problems and psychosocial function in children with cancer. *Paediatric oncology*, 20,3,37-41.
- Guindon, M. (2002). Toward accountability in the use of the self esteem construct: Jou. of Counseling& Development, vol. 80:204-14.
- Gardiner, C., Gott, M., Payne, S., Small, N., Barnes, S., Halpin, D., ... & Seemark, D. (2010). Exploring the care needs of patients with advanced COPD: an overview of the literature. *Respiratory medicine*, 104(2), 159-165.
- Helland, W. A., & Helland, T. (2017). Emotional and behavioural needs in children with specific language impairment and in children with autism spectrum disorder: The importance of pragmatic language impairment. *Research Developmental Disabilities*, 70, 33-39.
- Karampour, S., Fereidooni-Moghadam, M., Zarea, K., & Cheraghian, B. (2018). The prevalence of death anxiety among patients with breast cancer. *BMJ supportive & palliative care*, 8(1), 61-63
- Kavas, A. (2009). Self-esteem and health-risk behaviors among Turkish late adolescents.
- Kim, H. K., Kim, K. M., & Nomura, S. (2016). The effect of group art therapy on older Korean adults with neurocognitive disorders. *The Arts in Psychotherapy*, 47, 48-54.
- Laub Huizenga, L. A. (2011). Expressive Writing Intervention for Teens Whose Parents Have Cancer (Doctoral dissertation, University of Kansas).
- Leary, M. (2004). The self we know and the self we show: Self esteem, self presentation, and the maintenance of interpersonal relationships, in: Brewer, M. & Hestone, M. (eds). *Emotion and motivation*, U.K: Black well publishing.
- Lubis, H & Siregar. (2015). Quality of Life in Children with Cancer and Their Normal Siblings, *Pediatric Indonesian*, 55(4), 243-248.
- Marcic Renata,& Grum Darja KOBAL (2011): Gender differences in self- concept and self-esteem components, *Journal of Studia psychologica*, 53, 4 pp373-384.



-
- Mattila, M-L. (2013). Autism spectrum disorders an epidemiological and clinical study. Phd.Faculty of Medicine, University of Oulu.
- McDonald, S., Togher, L.& Code, C, (2014). Social and communication disorders following traumatic brain injury. New York, Psychology Press.
- Mruk Christopher J(2006): Self-Esteem Research, Theory, and Practice Toward a PositivePsychology of Self-Esteem. New York: Springer Publishing Company, Inc.
- Malchiodi, C. A. (Ed.). (2011). Handbook of art therapy. Guilford Press.
- Norbury, Courtenay (2013). Practitioner review: Social (pragmatic) communication disorder conceptualization, evidence and clinical implications. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(4), 429-442.
- Orth, U., Trzesniewski, K., & Robins, R. (2010). Self esteem development from young adulthood to old age: A cohort-sequential longitudinal study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 98(4), 645-658.
- O'Handley, R. D., Radley, K. C., & Lum, J. D. (2016). Promoting social communication in a child with specific language impairment. *Communication disorders quarterly*, 37(4), 199-210. *Psychiatry*. 55(3), 204-216.
- Ritchie, M. A. (2001). Self-esteem and hopefulness in adolescents with cancer. *Journal of Pediatric Nursing*, 16(1), 35-42.
- Swineford, L., Thurm, A., Baird, G, Wetherby, A., and Swedo, S. (2014). Social (pragmatic) communication disorder: a research review of this new DSM-5 diagnostic category. *Journal of Neurodevelopmental Disorders*. 6(1):41. doi:10.1186/1866-1955-6-41. *Adolescence*, 44(173):187-98.
- Sharon, L, Manne, et al (1995): predictors of depressive symptomolgy among parents of newly diagnosed children with cancer. *Journal of pediatric psychology*. Vol. 20 No(2),
- Taylor, L. J., & Whitehouse, A. J. (2016). Autism spectrum disorder, language disorder, and social (pragmatic) communication disorder: overlaps, distinguishing features, and clinical implications. *Australian Psychologist*, 51(4), 287-295.
- Von Essen, L., Enskär, K., Kreuger, A., Larsson, B., & Sjödén, P. O. (2000). Self-esteem, depression and anxiety among Swedish children and adolescents on and off cancer treatment. *Acta Paediatrica*, 89(2), 229-236.
- Zaher, L. et al. (1994): Chronic illness in lebanese preschoolers : Impact of illness and child temperament on the family. *American Journal of orthopsychiatry*, vol. 64 (3),p.p396-40.